

2.3.1 Rovnice v součinovém tvaru

Předpoklady: 1710, 2203

Pedagogická poznámka: Hodina obsahuje poměrně dost příkladů (20). I když je někteří stihli vypočítat, mám trochu obavu, zda postup nebyl příliš rychlý. Pokud by se mělo něco vynechávat, doporučoval bych část příkladu 5, kde jde v podstatě pouze o opakování rozkladů na součin.

Řešíme rovnici: $(x+3)(2x-1)=0$.

Obě strany rovnice jsou čísla:

- Pravá strana = nula.
- Levá strana = součin čísel (závorka znamená číslo), který má vyjít 0 (aby platila rovnice).

\Rightarrow 2 možnosti:

- Ani jedno z čísel v součinu na levé straně není 0 \Rightarrow součin také není 0 \Rightarrow rovnice nevyjde.
- Alespoň jedno číslo v součinu je 0 \Rightarrow součin je 0, bez ohledu na ostatní čísla \Rightarrow rovnice vyjde.

\Rightarrow Zjistíme, pro která x se jednotlivé závorky rovnají 0, a máme kořeny rovnice.

Př. 1: Vyřeš rovnici $(x+3)(2x-1)=0$.

První závorka se rovná nule:

$$x+3=0$$

$$x=-3$$

Druhá závorka se rovná nule:

$$2x-1=0$$

$$2x=1$$

$$x=\frac{1}{2} \quad K=\left\{-3, \frac{1}{2}\right\}$$

Mohli bychom stejným způsobem řešit rovnici $(x+3)(2x-1)=1$?

Záleží na tom, jak můžeme získat 1 jako součin dvou čísel: nekonečně mnoho způsobů (například $1=1\cdot 1$, $1=2\cdot \frac{1}{2}$, $1=3\cdot \frac{1}{3}$, ...) \Rightarrow nemůžeme o žádné ze závorek prohlásit, že se určitě rovná nějakému číslu \Rightarrow takto rovnici bez nuly na pravé straně nespočítáme.

Řešením rovnice v součinovém tvaru (s nulou na jedné straně), jsou všechna čísla, pro která se libovolná ze závorek v součinu rovná nule.

Pravidlo je možné použít pouze tehdy, když je jedna strana rovnice rovna nule.

Pedagogická poznámka: Připomínám studentům, že tento typ rovnic budou během svého studia potřebovat v různých situacích velmi často ve všech ročnících. Například

při počítání průběhu funkce na konci čtvrtáku patří řešení rovnic převoditelných na součinový tvar mezi největší problémy.

Př. 2: Vyřeš rovnice:

a) $(x+1)(x-3)(x+\pi)=0$

b) $x(3x+1)(x+\sqrt{2})(4x-\pi)=0$

c) $(3x+2)(x\sqrt{2}+1)(\pi^2 x+\pi)=0$

d) $(x\sqrt{2}-x-1)(\pi x+\sqrt{2})(x^2+1)=0$

a) $(x+1)(x-3)(x+\pi)=0$

$$(x+1)=0$$

$$x=-1$$

$$K=\{-1;3;-\pi\}$$

$$(x-3)=0$$

$$x=3$$

$$(x+\pi)=0$$

$$x=-\pi$$

b) $x(3x+1)(x+\sqrt{2})(4x-\pi)=0$

$$x=0$$

$$(3x+1)=0$$

$$x=-\frac{1}{3}$$

$$(x+\sqrt{2})=0$$

$$x=-\sqrt{2}$$

$$(4x-\pi)=0$$

$$x=\frac{\pi}{4}$$

$$K=\left\{-\sqrt{2}; -\frac{1}{3}; 0; \frac{\pi}{4}\right\}$$

c) $(3x+2)(x\sqrt{2}+1)(\pi^2 x+\pi)=0$

$$(3x+2)=0$$

$$(x\sqrt{2}+1)=0$$

$$(\pi^2 x+\pi)=0$$

$$x=-\frac{2}{3}$$

$$x=-\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\pi^2 x = -\pi$$

$$x=-\frac{\pi}{\pi^2} = -\frac{1}{\pi}$$

$$K=\left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{\pi}\right\}$$

d) $(x\sqrt{2}-x-1)(\pi x+\sqrt{2})(x^2+1)=0$

$$(x\sqrt{2}-x-1)=0$$

$$(\pi x+\sqrt{2})=0$$

$$(x^2+1)=0 \text{ - nejde nikdy}$$

$$x(\sqrt{2}-1)=1$$

$$x=-\frac{\sqrt{2}}{\pi}$$

$$x=\frac{1}{\sqrt{2}-1} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}+1$$

$$K=\left\{-\frac{\sqrt{2}}{\pi}; \sqrt{2}+1\right\}$$

Pedagogická poznámka: Problémy mají někteří s body:

b) Kde zapomínají na 0 (x stojící před závorkami neberou v úvahu).

d) Kde přidávají řešení kvůli závorce x^2+1 , která se nule nikdy nerovná.

Př. 3: Najdi chybu v následujícím postupu:

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\x^2 &= 4 \quad / \sqrt{} \\x &= 2\end{aligned}$$

Chyba: Není pravda, že platí $\sqrt{x^2} = x$. Platí $\sqrt{x^2} = |x|$. ⇒ Správný postup:

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\x^2 &= 4 \quad / \sqrt{} \\\sqrt{x^2} &= |x| = 2 \\K &= \{-2; 2\}\end{aligned}$$

Př. 4: Vyřeš rovnici $x^2 - 4 = 0$ bez použití odmocňování.

Použijeme součinový tvar \Rightarrow musíme z výrazu $x^2 - 4$ vyrobit součin (proto jsme se učili rozklady na součin).

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= 0 \\(x-2)(x+2) &= 0 \\K &= \{-2; 2\}\end{aligned}$$

Př. 5: Vyřeš rovnice převedením na součinový tvar:

a) $x^2 - 9 = 0$	b) $x^2 - x - 12 = 0$
c) $x^4 - 4 = 0$	d) $(9x^2 - 4)(1 - x^2) = 0$
e) $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$	
a) $x^2 - 9 = 0$ $(x-3)(x+3) = 0$ $K = \{-3; 3\}$	b) $x^2 - x - 12 = 0$ $(x-4)(x+3) = 0$ $K = \{-3; 4\}$
c) $x^4 - 4 = 0$ $(x^2 - 2)(x^2 + 2) = 0$ $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2) = 0$ $K = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$	d) $(9x^2 - 4)(1 - x^2) = 0$ $(3x - 2)(3x + 2)(1 - x)(1 + x) = 0$ $K = \left\{-1; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; 1\right\}$
e) $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$ $x^3 - x - 2x^2 + 2 = 0$ $x(x^2 - 1) - 2(x^2 - 1) = 0$ $(x^2 - 1)(x - 2) = 0$ $(x + 1)(x - 1)(x - 2) = 0$ $K = \{-1; 1; 2\}$	

Př. 6: Vyřeš rovnici: $x^2 - 3x = 4$.

Rovnice není v součinovém stavu \Rightarrow nejde použít dnešní postup \Rightarrow předěláme si ji tak, aby napravo vznikla nula: $x^2 - 3x - 4 = 0$.

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$K = \{-1, 4\}$$

Pedagogická poznámka: Pře řešení příkladu se objevují dvě chyby vedoucí ke stejnemu špatnému řešení. Kromě rozkladu $x(x-3) = 4$, který porušuje podmínku nulové pravé strany, někteří studenti převedou čtyřku doleva, kde už mají rozloženou původní levou stranu $x(x-3) - 4 = 0$. Vpravo je sice nula, ale součinový tvar nejde použít, protože na levé straně není součin.

Myslím, že zde je dobré místo připomenout studentům, jaké výhody má, když si s pravidlem pamatují i jeho odůvodnění. Pokud totiž chápou, kde se vzala možnost využívat součinový tvar, ani jednu z předchozích chyb nemohou udělat.

Př. 7: Vyřeš rovnici: $x(x-1) = 6$.

Rovnice není v součinovém stavu (vpravo není nula, součin vlevo nestačí) \Rightarrow nejde použít dnešní postup \Rightarrow předěláme si ji, aby vznikla nula vpravo a roznásobíme závorku:

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Ted' má smysl dělat součin: $(x-3)(x+2) = 0$.

$$K = \{-2, 3\}$$

Př. 8: Najdi chybu v následujícím postupu:

$$x^2 - 1 = x + 1$$

$$(x-1)(x+1) = x + 1 \quad /:(x+1)$$

$$x-1=1$$

$$x=2$$

Špatný krok: $(x-1)(x+1) = x + 1 \quad /:(x+1)$. Dělíme výrazem s neznámou a neděláme podmínku \Rightarrow pokud by platilo $x+1=0$ dělili bychom nulou a ztratili kořen.

Správné řešení:

$$x^2 - 1 = x + 1$$

$$(x-1)(x+1) = x + 1 \quad /:(x+1) \quad x \neq -1$$

$$x-1=1$$

$$x=2$$

Kontrolujeme zakázané $x = -1$ dosazením do tvaru před dělením:

$$(-1)^2 - 1 = (-1) + 1$$

$0 = 0 \Rightarrow$ Pro $x = -1$ rovnice vychází $\Rightarrow x = -1$ je také kořenem.

$$K = \{-1; 2\}$$

Pokud se zdá, že můžeme rovnici výrazem vydělit, můžeme rovnici převést na součinový tvar.

Př. 9: Řeš rovnici $x^2 - 1 = x + 1$ převedením na součinový tvar.

$$\begin{aligned}x^2 - 1 &= x + 1 \\(x-1)(x+1) - (x+1) &= 0 \\(x+1)[(x-1)-1] &= 0 \\(x+1)(x-2) &= 0\end{aligned}\qquad K = \{-1; 2\}$$

Př. 10: Řeš rovnice převedením na součinový tvar:

a) $y(y+1) = (y+1)(y+3)$ b) $x^2 - 4 = x - 2$
c) $9 - x^2 = x - 3$ d) $3x^2 - 2x = 5x^2 + 3x$

a) $2y(y+1) = (y+1)(y+3)$ b) $x^2 - 4 = x - 2$
 $2y(y+1) - (y+1)(y+3) = 0$ $(x-2)(x+2) - (x-2) = 0$
 $(y+1)[2y - (y+3)] = 0$ $(x-2)[(x+2)-1] = 0$
 $(y+1)(y-3) = 0$ $(x-2)(x+1) = 0$
 $K = \{-1; 3\}$ $K = \{-1; 2\}$
c) $9 - x^2 = x - 3$ d) $3x^2 - 2x = 5x^2 + 3x$
 $(3-x)(3+x) - (x-3) = 0$ $0 = 2x^2 + 5x$
 $(3-x)(3+x) + (3-x) = 0$ $0 = x(2x+5)$
 $(3-x)[(3+x)+1] = 0$ $K = \left\{-\frac{5}{2}; 0\right\}$
 $(3-x)(x+4) = 0$
 $K = \{-4; 3\}$

Poznámka: Předchozí příklady je samozřejmě možné (zřejmě asi i výhodněji) řešit takto:

$$\begin{aligned}x^2 - 4 &= x - 2 \\x^2 - x - 2 &= 0 \\(x-2)(x+1) &= 0\end{aligned}\qquad K = \{-1; 2\}$$

Př. 11: Petáková:
strana 12/cvičení 2 a) b)

Shrnutí: Pokud má rovnice na jedné straně nulu a na druhé je možné vytvořit součin, vypočteme jednotlivé kořeny snadno z jednotlivých členů součinu.