

### 3.2.11 Obvody a obsahy obrazců I

#### Předpoklady:

S pomocí vzorců v uvedených v tabulkách řeš následující příklady


**Př. 1:** Urči výšku lichoběžníku o obsahu  $54\text{cm}^2$  a základnách  $7\text{cm}$  a  $5\text{cm}$ .

$$\text{Obsah lichoběžníku: } S = \frac{a+c}{2}v \Rightarrow v = \frac{2S}{a+c} = \frac{2 \cdot 54}{7+5} \text{cm} = 9 \text{cm}$$

Výška lichoběžníku je  $9\text{cm}$ .

**Př. 2:** Vypočti obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou o  $a = 6\text{cm}$  a ramenem  $b = 5\text{cm}$ .

Vzorec pro obsah trojúhelníka  $S = \frac{a \cdot v_a}{2} \Rightarrow$  musím spočítat výšku na jednu ze stran, které známe



Trojúhelník je rovnoramenný  $\Rightarrow$  výška na základnu je zároveň těžnicí  $\Rightarrow$

$$b^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$v = \sqrt{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{5^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2} \text{cm} = 4 \text{cm}$$


$$\text{Spočteme obsah: } S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} \text{cm}^2 = 12 \text{cm}^2$$

**Př. 3:** Urči stranu rovnostranného trojúhelníku s obsahem  $15\text{cm}^2$ .

Vzorec pro obsah rovnostranného trojúhelníka můžeme upravit do tvaru, kdy obsahuje pouze velikost strany  $a$ .

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2}$$

Výšku určíme pomocí Pythagorovy věty:



$$a^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$v^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3}{4}a^2 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} = \frac{a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$


Vyjádříme  $a$ :  $\frac{4S}{\sqrt{3}} = a^2$

$$a = \sqrt{\frac{4S}{\sqrt{3}}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 15}{\sqrt{3}}} \text{ cm} = 5,9 \text{ cm}$$

Rovnostranný trojúhelník s obsahem  $15 \text{ cm}^2$  má stranu o délce  $5,9 \text{ cm}$ .

**Pedagogická poznámka:** Pokud mají studenti k dispozici tabulky, většinou se jim podaří objevit vzorec pro obsah rovnostranného trojúhelníku a příklad se zjednoduší na vyjádření ze vzorce.

**Př. 4:** Odvod' vzorec pro obsah pravidelného šestiúhelníku o straně  $a$ .



Pravidelný šestiúhelník je možné rozložit na šest stejných rovnostranných trojúhelníků o straně  $a$  (šestiúhelník je vepsán kružnici, je možné ho rozložit na šest stejných rovnoramenných trojúhelníků, jejich vrcholové úhly u středu šestiúhelníka jsou stejné a musí

dát dohromady  $360^\circ$ , každý z nich je tedy roven  $60^\circ$  a všechny trojúhelníky jsou tedy rovnostranné).

$$S = 6 \cdot S_{\triangle} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

**Př. 5:** Urči obsah obecného trojúhelníka o stranách  $a = 5 \text{ cm}$ ,  $b = 6 \text{ cm}$ ,  $c = 7 \text{ cm}$ . Urči délky všech jeho výšek.

Zadaný trojúhelník není pravouhlý, nemá žádnou jinou speciální vlastnost  $\Rightarrow$  nedokážeme spočítat výšku a nemůžeme použít vzorec  $S = \frac{a \cdot v_a}{2} \Rightarrow$  hledáme vzorec pro výpočet obsahu

ze stran  $\Rightarrow$  Heronův vzorec:  $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ,  $s = \frac{a+b+c}{2}$

$$s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{5+6+7}{2} \text{ cm} = 9 \text{ cm}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)} \text{ cm}^2 = 6\sqrt{6} \text{ cm}^2 \doteq 14,7 \text{ cm}^2$$

Výšky můžeme určit pomocí vzorce pro výpočet obsahu (už ho známe).

$$S = \frac{a \cdot v_a}{2} \Rightarrow v_a = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 6\sqrt{6}}{5} \text{ cm} = \frac{12\sqrt{6}}{5} \text{ cm} \doteq 5,9 \text{ cm}$$


$$\text{Podobně i zbývající výšky: } v_b = \frac{2S}{b} = \frac{2 \cdot 6\sqrt{6}}{6} \text{ cm} = 2\sqrt{6} \text{ cm} \doteq 4,9 \text{ cm}$$

$$v_c = \frac{2S}{c} = \frac{2 \cdot 6\sqrt{6}}{7} \text{ cm} = \frac{12}{7}\sqrt{6} \text{ cm} \doteq 4,2 \text{ cm}$$

**Pedagogická poznámka:** Více než polovina studentů má problémy při určování výšek.

Automaticky se zadání snaží vyřešit pomocí vět pro pravouhlý trojúhelník a ani je nenapadne uvažovat o použití vzorce pro obsah (mají ho v paměti zařazený zcela jednosměrně jako cestu k počítání obsahu).

**Př. 6:** Vypočti obsah vyšrafovaného obrazce (vzdálenosti jsou udané v cm):




Obrazec je tvořen čtvercem  $40 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ , ze kterého jsou vyříznuty tři kusy:

- dva pravouhlé trojúhelníky s odvěsnami  $10 \text{ cm}$  a  $10 \text{ cm}$ . Dohromady tvoří čtverec  $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$
- pravidelný šestiúhelník o výšce  $20 \text{ cm}$

odečtením ploch výřezů od plochy velkého čtverce získáme výsledek

pro určení plochy šestiúhelníku musíme znát jeho stranu (vzorec pro obsah jsme odvodili v příkladu 3)



Pokud je výška celého šestiúhelníku 20 cm, rovná se výška rovnostranných trojúhelníků, ze kterých je složen 10 cm  $\Rightarrow$  dosazením do vztahu pro výšku určíme stranu šestiúhelníku:

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2} a \Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}} v = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

$$S = S_1 - S_2 - S_3 = 40^2 - 10^2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} \left( \frac{20}{\sqrt{3}} \right)^2 \text{ cm} = 1600 - 100 - 200\sqrt{3} \text{ cm} = 100(15 - 2\sqrt{3}) \text{ cm}$$

$$S \doteq 1154 \text{ cm}^2$$


Vyšrafovaný obrazec má přibližně povrch  $1154 \text{ cm}^2$ .

**Př. 7:** Urči obvod a obsah pravidelného pětiúhelníku, má-li jeho nejkratší úhlopříčka délku 10 cm.

Obvod pravidelného pětiúhelníku:  $o = na = 5a$

Obsah pravidelného pětiúhelníku:  $S = n \frac{a\rho}{2} = \frac{5}{2} a\rho$

$\Rightarrow$  musíme ze zadaného údaje určit délku strany a poloměr kružnice vepsané.



**Určení strany  $a$  z rovnoramenného trojúhelníku  $ABC$ :**

Součet vnitřních úhlů v pětiúhelníku:  $(n-2) \cdot 180^\circ = (5-2) \cdot 180^\circ = 540^\circ$

Velikost úhlu  $\alpha$ :  $\frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$

Úsečka  $BS$  dělí trojúhelník na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky s úhlem  $\frac{\alpha}{2} \Rightarrow$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{u}{a} \Rightarrow a = \frac{u}{\sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{10}{2 \cdot \sin \frac{108^\circ}{2}} \text{ cm} \doteq 6,18 \text{ cm}$$

**Určení poloměru kružnice vepsané z trojúhelníku  $EDS$ :**

Úhel  $ESD$  je pětinou plného úhlu:  $\sphericalangle ESD = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ .

Přímka  $BS$  dělí rovnoramenný trojúhelník  $EDS$  na dva shodné pravoúhlé trojúhelníky  $\Rightarrow$

$$\varphi = \frac{\sphericalangle ESD}{2} = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{a}{2}}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{a}{2 \operatorname{tg} \varphi} = \frac{6,18}{2 \cdot \operatorname{tg} 36^\circ} \text{ cm} \doteq 4,25 \text{ cm}$$

**Dosazení do vzorců:**


Obvod:  $o = na = 5a = 5 \cdot 6,18 \text{ cm} = 30,9 \text{ cm}$

Obsah:  $S = n \frac{a\rho}{2} = \frac{5}{2} a\rho = \frac{5}{2} 6,18 \cdot 4,25 \text{ cm}^2 = 65,7 \text{ cm}^2$

Pravidelný pětiúhelník s nejkratší úhlopříčkou o délce 10 cm, má obvod 30,9 cm a obsah 65,7 cm<sup>2</sup>.

**Př. 8:** Střední příčka rozdělí lichoběžník na dva menší lichoběžníky. Urči poměr jejich obsahů.

Obsah lichoběžníku:  $S = \frac{(a+c)v}{2}$



Střední příčka je průměrem obou základů:  $s = \frac{a+c}{2}$ .

Modrý lichoběžník:  $S_m = \frac{(s+c)\frac{v}{2}}{2} = \frac{\left(\frac{a+c}{2}+c\right)v}{4} = \frac{\left(\frac{a+3c}{2}\right)v}{4} = \frac{(a+3c)v}{8}$

Zelený lichoběžník:  $S_z = \frac{(a+s)\frac{v}{2}}{2} = \frac{\left(a+\frac{a+c}{2}\right)v}{4} = \frac{\left(\frac{3a+c}{2}\right)v}{4} = \frac{(3a+c)v}{8}$

Poměr lichoběžníků:  $\frac{S_m}{S_z} = \frac{\frac{(a+3c)v}{8}}{\frac{(3a+c)v}{8}} = \frac{a+3c}{3a+c}$

Vzniklé lichoběžníky mají v obsahy v poměru  $\frac{a+3c}{3a+c}$ .

**Shrnutí:**

