

## 5.2.9 Vzdálenost bodu od roviny

**Předpoklady:** 5208

Opakování z minulé hodiny (definice vzdálenosti bodu od přímky):

Je dána přímka  $p$  a bod  $A$ . Vzdáleností bodu  $A$  od přímky  $p$  rozumíme vzdálenost bodu  $A$  od bodu  $P$ , který je patou kolmice vedené v rovině  $Ap$  k přímce  $p$  z bodu  $A$ .

Máme  $A$  bod a rovinu  $\rho$ , vzdálenost bodu  $A$  od roviny  $\rho$  opět potřebujeme převést na vzdálenost dvou bodů. Jaký bod máme v rovině  $\rho$  najít?

Podobně jako u vzdálenosti bodu od přímky půjde o kolmý průmět bodu  $A$  do roviny  $\rho$ .


**Př. 1:** Zformuluj definici vzdálenosti bodu od roviny analogickou definici vzdálenosti bodu od přímky.

Je dána rovina  $\rho$  a bod  $A$ . Vzdáleností bodu  $A$  od roviny  $\rho$  rozumíme vzdálenost bodu  $A$  od bodu  $P$ , který je patou kolmice vedené z bodu  $A$  k rovině  $\rho$ .

Takto definovaná vzdálenost bodu od roviny je nejkratší vzdáleností mezi bodem  $A$  a libovolným bodem roviny  $\rho$ .


**Př. 2:** Je dán pravidelný čtyřboký jehlan  $ABCDV$ ,  $|AB| = a = 4 \text{ cm}$ ,  $|SV| = v = 5 \text{ cm}$ . Urči:  
a) vzdálenost bodu  $V$  od roviny  $ABC$ ,      b) vzdálenost bodu  $B$  od roviny  $S_{AB}S_{CD}V$ ,  
c) vzdálenost bodu  $S_{BC}$  od roviny  $ADV$ .

a) vzdálenost bodu  $V$  od roviny  $ABC$



b) vzdálenost bodu  $B$  od roviny  $S_{AB}S_{CD}V$


Z obrázku je vidět, že kolmým průmětem bodu  $V$  do roviny  $ABC$  je střed podstavy  $S \Rightarrow$  vzdálenost bodu  $V$  od roviny  $ABC$  je tedy rovna  $v = 5 \text{ cm}$ .




Přímka  $AB$  je kolmá k rovině  $S_{AB}S_{CD}V$ ,  
 kolmým průmětem bodu  $B$  do roviny  
 $S_{AB}S_{CD}V$  je tedy bod  $S_{AB} \Rightarrow$  vzdálenost  
 bodu  $B$  od roviny  $S_{AB}S_{CD}V$  je rovna

$$\frac{a}{2} = 2 \text{ cm}.$$


c) vzdálenost bodu  $S_{BC}$  od roviny  $ADV$



Kolmý průmět bodu  $S_{BC}$  (označíme si ho  $P$ )  
 do roviny  $ADV$  bude určitě ležet v rovině  
 $S_{AD}S_{BC}V$  (je kolmá na rovinu  $ADV$  a prochází  
 bodem  $S_{BC}$ ). Nakreslíme si trojúhelník  
 $S_{AD}S_{BC}V$ .



Vypočteme délku strany  $S_{BC}V$  z pravoúhlého trojúhelníku  $S_{BC}VS$ .




$$|S_{BC}V|^2 = |SS_{BC}|^2 + |SV|^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + v^2 = \frac{a^2 + 4v^2}{4}$$

$$|S_{BC}V| = \sqrt{\frac{a^2 + 4v^2}{4}}$$

$$|S_{BC}V| = \frac{\sqrt{a^2 + 4v^2}}{2}$$

Doplňme do obrázku trojúhelníku  $S_{AD}S_{BC}V$ .



Možností jak určit úsečku  $PS_{BC}$  je více, nejjednodušší vychází ze vzorce pro obsah trojúhelníka:

$$S = \frac{av_a}{2} = \frac{bv_b}{2} = \frac{cv_c}{2}.$$

Jednu dvojici strana-výška tvoří úsečky  $S_{AD}S_{BC}$  a  $SV$  (obě známe), druhou úsečky  $S_{AD}V$  a  $PS_{BC}$  (druhou chceme určit)  $\Rightarrow$


$$S = \frac{av_a}{2} = \frac{|S_{AD}S_{BC}||SV|}{2} = \frac{|S_{BC}V||PS_{BC}|}{2}$$

$$|S_{AD}S_{BC}||SV| = |S_{BC}V||PS_{BC}|$$


$$|PS_{BC}| = \frac{|S_{AD}S_{BC}||SV|}{|S_{BC}V|} = \frac{av}{\sqrt{a^2 + 4v^2}} = \frac{2av}{2\sqrt{a^2 + 4v^2}}$$

Dosadíme:  $|PS_{BC}| = \frac{2av}{\sqrt{a^2 + 4v^2}} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 5}{\sqrt{4^2 + 4 \cdot 5^2}} \text{ cm} = 3,71 \text{ cm}.$

**Př. 3:** Je dána standardní krychle  $ABCDEFGH$   $a = 4 \text{ cm}$ . Urči vzdálenost bodu  $E$  od roviny  $AFH$ .



Nakreslíme si obdélník  $ACGE$ .



Doplňme obrázek:


Hledáme kolmý průmět bodu  $E$  do roviny  $AFH$ . Víme z předchozích příkladů, že přímka  $EC$  je kolmá k rovině  $AFH$  a hledaným průmětem bude její průsečík s rovinou  $AFH$ . Předchozí informaci pro vyřešení příkladu nepotřebujeme, stačí si uvědomit, že krychle je souměrná podle roviny  $ACEG$  a kolmice na  $E$  i kolmý průmět musí ležet v této rovině (jinak by průměty byly dva a to není možné).

Dopočteme délku úsečky  $AS$ :

$$|AS|^2 = |ES|^2 + |EA|^2 = a^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$|AS|^2 = a^2 + \frac{2}{4}a^2 = \frac{3}{2}a^2$$

$$|AS| = a\sqrt{\frac{3}{2}}.$$



Využijeme podobnost trojúhelníků  $ASE$  a  $AEP$ .

$$\frac{|ES|}{|AS|} = \frac{|EP|}{|AE|}$$

$$|EP| = |AE| \frac{|ES|}{|AS|} = a \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{\frac{3}{2}}} = a \frac{\sqrt{2}\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}} = a \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Dosadíme:  $|EP| = a \frac{\sqrt{3}}{3} = 4 \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ cm} = 2,31 \text{ cm}$


**Př. 4:** Zformuluj kritérium pro rovnoběžnost přímky s rovinou pomocí vzdálenosti bodu od roviny.

Přímka  $p$  je rovnoběžná s rovinou  $\rho$ , jestliže lze na přímce  $p$  najít dva různé body ležící v téže poloze ohraničeném rovinou  $\rho$ , které mají od roviny  $\rho$  stejnou vzdálenost.

**Př. 5:** Zformuluj kritérium pro rovnoběžnost dvou rovin pomocí vzdálenosti bodu od roviny.

Dvě roviny  $\rho$  a  $\sigma$  jsou rovnoběžné, jestliže lze v rovině  $\sigma$  najít tři různé body, které neleží v přímce, ale leží ve stejném poloze s hraniční rovinou  $\rho$  a které mají od roviny  $\rho$  stejnou vzdálenost.

**Př. 6:** Je dán pravidelný šestiboký jehlan  $ABCDEFV$ ,  $|AB| = a = 4 \text{ cm}$ ,  $|SV| = v = 6 \text{ cm}$ . Urči vzdálenost bodu  $F$  od roviny  $ABV$ .




Potřebujeme najít kolmý průmět bodu  $F$  do roviny  $ABV \Rightarrow$  problém pata kolmice z bodu  $F$  leží mimo jehlan  $\Rightarrow$  hledáme jiný bod se stejnou vzdáleností, jehož pata leží na hranici jehlanu.


Přímka  $CF$  je rovnoběžná s přímkou  $AB \Rightarrow$  je rovnoběžná s rovinou  $ABV \Rightarrow$  vzdálenost všech bodů této přímky od roviny  $ABV$  je stejná jako vzdálenost bodu  $A$ .

Kolmice z bodu  $S$  na rovinu  $ABV$  leží v rovině  $S_{AB}S_{DE} \Rightarrow$  vzdálenost bodu  $S$  od roviny  $ABV$  určíme pomocí trojúhelníku  $S_{AB}S_{DE}V$ .

Nakreslíme si trojúhelník  $S_{AB}S_{DE}V$ .



Délku úsečky  $S_{AB}S$  určíme z obrázku podstavy:




Vzdálenost  $|S_{AB}S|$  je také výškou v rovnostranném trojúhelníku se stranou  $a$ .

$$x^2 = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4a^2 - a^2}{4}} = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Vzdálenost  $|S_{AB}V|$  je přeponou pravouhlého trojúhelníku  $S_{AB}SV$ :

$$|S_{AB}V| = \sqrt{v^2 + x^2} = \sqrt{v^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4v^2 + 3a^2}{4}} = \frac{\sqrt{4v^2 + 3a^2}}{2}.$$

Doplníme obrázek:



Využijeme podobnost trojúhelníků  $S_{AB}SV$  a  $S_{AB}SP$ .

$$\frac{|SV|}{|S_{AB}V|} = \frac{|PS|}{|S_{AB}S|}$$

$$|PS| = |SV| \frac{|S_{AB}S|}{|S_{AB}V|} = v \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{4v^2 + 3a^2}}{2}} = \frac{v \cdot a\sqrt{3}}{\sqrt{4v^2 + 3a^2}}$$

Dosadíme:  $|PS| = \frac{v \cdot a\sqrt{3}}{\sqrt{4v^2 + 3a^2}} = \frac{6 \cdot 4\sqrt{3}}{\sqrt{4 \cdot 6^2 + 3 \cdot 4^2}} \text{ cm} = 3 \text{ cm}.$

**Př. 7:** Petáková:

strana 93/cvičení 24 c) f)

strana 93/cvičení 25 b)

strana 93/cvičení 26 c)

strana 93/cvičení 27 c)

**Shrnutí:** Vzdálenost bodu od roviny určujeme opět pomocí kolmého průmětu.