

## 7.2.1 Vektory


### Předpoklady: 7104

Některé fyzikální veličiny (například rychlost, síla) mají dvě charakteristiky:

- velikost
- směr

Jak je znázornit, jedno číslo (jako například pro hmotnost  $m = 55 \text{ kg}$ ) nestačí?

**Orientovaná úsečka:** úsečka s vyznačeným počátečním a koncovým bodem (označený šipkou)



Na obrázku je orientovaná úsečka  $AB$

- velikost: délka orientované úsečky
- směr: směr orientované úsečky

**nulové orientované úsečky** – počáteční bod splývá s koncovým  $\Rightarrow$  nulová velikost

orientovaná úsečka obsahuje víc informací než jenom velikost a směr, určuje i umístění  $\Rightarrow$

**nenulový vektor  $u$**  je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a stejný směr


**nulový vektor** je množina všech nulových úseček

**Dodatek:** Podobně zavádíme: racionální číslo je množina všech zlomků, které je možné

zkrátit do stejného základního tvaru ( $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{20}{30} = \frac{-14}{-21}$ ).

Vektor zapisujeme dvěma způsoby: tučné malé písmeno  $u$ , nebo malé písmeno se šipkou  $\vec{u}$ .

**Př. 1:** Rozhodni, které z orientovaných úseček na obrázku tvoří stejné vektory. Kolik různých vektorů je na obrázku znázorněno?



vektor  $u$  – orientované úsečky  $AB, EF$

vektor  $v$  – orientované úsečky  $IJ, CD$

vektor  $w$  – orientovaná úsečka  $LK$

vektor  $x$  – orientovaná úsečka  $HG$

vektor  $y$  – orientovaná úsečka  $MN$

⇒ sedm orientovaných úseček znázorňuje pouze pět různých vektorů


Libovolnou úsečku, která určuje vektor  $u$  nazýváme **umístění vektoru  $u$** .

u předchozího příkladu říkáme:

- orientované úsečky  $AB$ ,  $EF$  jsou umístěním vektoru  $u$
- umístěním vektoru  $x$  je orientovaná úsečka  $HG$
- apod.

**Př. 2:** V rovině je dán vektor  $u$  orientovanou úsečkou  $AB$  ( $A[1;2]$ ,  $B[3;3]$ ). Zakresli do obrázku umístění vektoru:

- orientovanou úsečkou  $AB$
- orientovanou úsečkou  $CD$ , pokud  $C[-1;3]$
- orientovanou úsečkou  $EF$ , pokud  $F[1;-1]$
- orientovanou úsečkou  $GH$ , pokud  $G[0;0]$



**Př. 3:** Rozhodni, kolik čísel je potřeba v rovině k určení:

- orientované úsečky
- vektoru

Orientovaná úsečka je určena čtyřmi čísly. Dvě čísla určují souřadnice počátečního bodu a dvě čísla určují souřadnice koncového bodu.

Když jsme kreslili obrázek k příkladu 4, všechny umístění vektoru jsme kreslili podle jednoho z krajních bodů tak, aby šipka znamenala posun o dvě pole doprava a jedno pole nahoru.

⇒ vektor charakterizují v rovině dvě čísla posun ve vodorovném a posun ve svislém směru ⇒ mohli bychom psát  $u = (2;1)$

**Postřeh:** Čísla charakterizující vektor  $\mathbf{u}$  z předchozího příkladu se shodují se souřadnicemi bodu  $H$  orientované úsečky  $GH$  (úsečky, která začíná v počátku soustavy souřadnic).

**Př. 4:** Orientovaná úsečka  $AB$  je dána body  $A[a_1; a_2]$  a  $B[b_1; b_2]$ . Urči vektor určený touto orientovanou úsečkou.

Vektor charakterizují dvě čísla, která popisují, jak jsme se posunuli z bodu  $A$  do bodu  $B$ .

Tento posun odpovídá rozdílu souřadnic  $b_1 - a_1$  a  $b_2 - a_2$ .

Zkusíme zda náš odhad odpovídá realitě z příkladu 4.

orientovaná úsečka  $AB$ :

- $b_1 - a_1 = 3 - 1 = 2$  (ve vodorovném směru se pohybujeme o dvě).
- $b_2 - a_2 = 3 - 2 = 1$  (ve svislém směru se pohybujeme o jedna).

Zdá se, že vzorce fungují.


Jde náš vzorec odvodit i jinak, více matematicky?

Vezmeme dvě umístění  $AB$  a  $CD$  vektoru  $\mathbf{u}$  na dvou různých rovnoběžných přímkách.

Orientované úsečky  $AB$  a  $CD$  jsou stejně dlouhé a navzájem rovnoběžné  $\Rightarrow$  čtyřúhelník  $ABDC$  je rovnoběžník.

Úhlopříčky ve čtyřúhelníku se půlí  $\Rightarrow$  úsečky  $AD$  a  $BC$  mají společný střed.

Platí i obráceně: úsečky  $AD$  a  $BC$  mají společný střed  $\Rightarrow$  čtyřúhelník  $ABDC$  je rovnoběžník a orientované úsečky  $AB$  a  $CD$  určují stejný vektor.



Toto pravidlo platí i v případě, že obě orientované úsečky leží na stejné přímce.

$\Rightarrow$  Orientované úsečky  $AB$  a  $CD$  určují stejný vektor právě tehdy, mají-li úsečky  $AD$  a  $BC$  společný střed.

Předchozí větu zapíšeme vzorcem:

$$S_{AD} = S_{BC}$$

Předeme do jednotlivých souřadnic (zapíšeme rovnou i třetí souřadnici pro případ, že pracujeme v prostoru):

$$\frac{a_1 + d_1}{2} = \frac{b_1 + c_1}{2}$$

$$\frac{a_2 + d_2}{2} = \frac{b_2 + c_2}{2}$$

$$\frac{a_3 + d_3}{2} = \frac{b_3 + c_3}{2}$$

$$a_1 + d_1 = b_1 + c_1$$

$$a_2 + d_2 = b_2 + c_2$$

$$a_3 + d_3 = b_3 + c_3$$

$$d_1 - c_1 = b_1 - a_1$$

$$d_2 - c_2 = b_2 - a_2$$

$$d_3 - c_3 = b_3 - a_3$$

Tyto rozdíly už známe, získali jsme tak čísla, která nám charakterizovala vektor (souřadnice umístění vektoru s počátečním bodem v počátku soustavy souřadnic), říkáme jim **souřadnice vektoru**. Abychom rozlišili souřadnice vektorů a souřadnice bodů, píšeme souřadnice vektorů do kulatých závorek  $\mathbf{u} = (u_1; u_2) = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$ .

Z exaktního odvození je také vidět, že **souřadnice vektoru nezávisí na orientované úsečce, kterou je určen.**

**Je-li vektor  $u$  určen orientovanou úsečkou  $AB$ , nazývají se čísla  $u_1 = b_1 - a_1$ ,  $u_2 = b_2 - a_2$  (případně v prostoru ještě  $u_3 = b_3 - a_3$ ) souřadnice vektoru  $u$ .  
Píšeme  $u = B - A = (u_1; u_2)$  (případně  $u = (u_1; u_2; u_3)$ ).**

**Př. 5:** Jsou dány body  $A[2;1]; B[4;2]; C[-1;-3]$ . Urči vektory  $u = AB$ ,  $v = BC$  a  $w = CA$ .

$$u = AB = B - A = (4 - 2; 2 - 1) = (2; 1)$$

$$v = BC = C - B = (-1 - 4; -3 - 2) = (-5; -5)$$

$$w = CA = A - C = (2 - [-1]; 1 - [-3]) = (3; 4)$$

**Př. 6:** Jsou dány body  $A[-2;3;-7]$  a  $B[4;-2;-1]$ . Urči vektory  $u = AB$  a  $v = BA$ .  
Porovnej výsledky.

$$u = AB = B - A = (4 - [-2]; -2 - 3; -1 - [-7]) = (6; -5; 6)$$

$$v = BA = A - B = (-2 - 4; 3 - [-2]; -7 - [-1]) = (-6; 5; -6)$$

Oba vektory mají opačný směr  $\Rightarrow$  jejich souřadnice musí být navzájem opačné.

**Př. 7:** Je dán vektor  $u = (-2; 3)$  a dvě jeho umístění  $AB$  a  $KL$ ,  $A[1;2]$ ,  $L[-1;1]$ . Urči souřadnice nezadaných bodů.

Souřadnice bodu  $B[b_1; b_2]$ .

Platí:  $u = (u_1; u_2) = (-2; 3) = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$ . Dosadíme:

- $-2 = b_1 - 1 \Rightarrow b_1 = -2 + 1 = -1$
- $3 = b_2 - 2 \Rightarrow b_2 = 3 + 2 = 5$

$B[-1; 5]$

Souřadnice bodu  $K[k_1; k_2]$ .


Platí:  $u = (u_1; u_2) = (-2; 3) = L - K = (l_1 - k_1; l_2 - k_2)$ . Dosadíme:

- $-2 = -1 - k_1 \Rightarrow k_1 = -1 + 2 = 1$
- $3 = 1 - k_2 \Rightarrow k_2 = 1 - 3 = -2$

$K[1; -2]$

**Pedagogická poznámka:** Na předchozím příkladu synchronizuji třídu, tak aby všichni stihli následující příklad. Pokud je čas mohou se pomalejší studenti vrátit k předchozímu příkladu, ti rychlejší pak postupovat dál.

**Př. 8:** Na obrázku jsou nakresleny vektory se souřadnicemi  $(-4;2)$ ,  $(0;-3)$ ,  $(4;2)$  a  $(1;-3)$ . Přiřaď vektorům jejich souřadnice.



Vektor  $a$  má kladnou  $x$ -ovou složku a zápornou  $y$ -vou složku  $\Rightarrow a = (1;-3)$ .

Vektor  $b$  má zápornou  $x$ -ovou složku a kladnou  $y$ -vou složku  $\Rightarrow b = (-4;2)$ .

Vektor  $c$  má nulovou  $x$ -ovou složku a zápornou  $y$ -vou složku  $\Rightarrow c = (0;-3)$ .

Vektor  $d$  má kladnou  $x$ -ovou složku a kladnou  $y$ -vou složku  $\Rightarrow d = (4;2)$ .

**Pedagogická poznámka:** Snažím se v hodině postupovat tak, abych stihl látku k tomu to místu. Zbytek hodiny by sice logicky patřil na její začátek, ale k pochopení podstaty vektorů není nutný, naopak studenty spíše odvádí od toho důležitého. Navíc stejnou problematikou se učebnice zabývá už v první hodině o posunutí.

Jak poznáme stejnou velikost?

Jasně - spočítáme vzdálenost krajních bodů.

Jak poznáme stejný směr?

Pohledem jednoduché, ale matematicky těžké.


Dvě nenulové orientované úsečky  $AB$  a  $CD$  mají **stejný směr**, jestliže:

- přímky  $AB$  a  $CD$  jsou rovnoběžné, různé a body  $B, D$  leží ve stejné polorovině s hraniční přímkou  $AC$
- přímky  $AB$  a  $CD$  jsou totožné a průnikem polopřímek  $AB$  a  $CD$  je opět polopřímka.


**Př. 9:** Nakresli dvojice orientovaných úseček  $AB$  a  $CD$ , tak aby obě orientované úsečky měly různou velikost a splňovaly:

- a) první z podmínek pro stejný směr orientovaných úseček
- b) druhou z podmínek pro stejný směr orientovaných úseček


a)



b)




**Př. 10:** Nakresli dvojici orientovaných úseček  $AB$  a  $CD$ , tak aby obě orientované úsečky měly stejnou velikost, přímky  $AB$  a  $CD$  byly totožné a průnikem polopřímek  $AB$  a  $CD$  nebyla polopřímka. Jak bys nazval jejich směry?



Směry orientovaných úseček bychom mohli nazvat opačné.

**Pedagogická poznámka:** Předchozí dva příklady slouží hlavně k tomu, aby studenti vůbec vnímali předchozí definici stejného směru. S variantou b) mají podstatně větší problémy. Zajímavé mě přijde, že téměř všichni kreslí situaci tak, aby splynuly body  $B$  a  $C$ .

Jestliže vektor  $u$  můžeme určit orientovanou úsečkou  $AB$ , která leží na přímce  $p$ , říkáme, že vektor  $u$  leží na přímce  $p$ . (spíše to však znamená, že má stejný směr jako přímka, protože ho můžeme určit i orientovanou úsečkou  $CD$ , která na přímce neleží).



Nulový vektor leží na každé přímce.

Jakou podmínku musí splňovat vektor  $\mathbf{u}$ , abychom mohli tvrdit, že leží v rovině  $\rho$  ?  
Vektor  $\mathbf{u}$  můžeme určit orientovanou úsečkou  $\mathbf{AB}$ , která leží v rovině  $\rho$  .

**Př. 11:** Petáková:  
strana 99/cvičení 1 a) b) c)  
strana 99/cvičení 2

**Shrnutí:** Vektor je množinou orientovaných úseček. Zachybuje pouze velikost a směr, ne umístění. Jeho souřadnice získáme rozdílem souřadnic koncových bodů.