

7.3.13 Vzdálenost bodu od přímky II

Předpoklady: 7312

Pedagogická poznámka: Následující příklad navazuje na poslední příklad minulé hodiny. Snažím se, aby si studenti ujasnili, co je stejné, co je jinak a podle toho se zařídili.

Př. 1: Najdi přímku, která je rovnoběžná s přímkou $x - 3y + 2 = 0$ a je od ní vzdálena $\sqrt{10}$.

Hledaná přímka je rovnoběžná \Rightarrow rovnice $x - 3y + c = 0 \Rightarrow$ potřebujeme najít bod, přes který přímka prochází \Rightarrow hledáme bod vzdálený od přímky $x - 3y + 2 = 0$ o $\sqrt{10} \Rightarrow$ takových bodů je nekonečně mnoho \Rightarrow musíme omezit výběr, například budeme hledat pouze body na ose y .

Bod na ose y : $A[0; a_y]$. Dosadíme do vzorce pro vzdálenost:

$$d = \frac{|ap_1 + bp_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|1 \cdot 0 - 3 \cdot a_y + 2|}{\sqrt{1 + (-3)^2}} = \sqrt{10}$$

$$\frac{|-3a_y + 2|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \quad \text{použijeme } |-3a_y + 2| = |3a_y - 2|$$

$$|3a_y - 2| = 10$$

rovnice s absolutní hodnotou \Rightarrow dělíme na intervaly

$$3a_y - 2 = 0 \Rightarrow a_y = \frac{2}{3}$$

$$a_y \in \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \Rightarrow$$

$$3a_y - 2 \leq 0 \Rightarrow |3a_y - 2| = -3a_y + 2$$

$$-3a_y + 2 = 10$$

$$3a_y = -8$$

$$a_y = -\frac{8}{3}$$

$$a_y \in \left(\frac{2}{3}; \infty\right) \Rightarrow$$

$$3a_y - 2 \geq 0 \Rightarrow |3a_y - 2| = 3a_y - 2$$

$$3a_y - 2 = 10$$

$$3a_y = 12$$

$$a_y = 4$$

\Rightarrow dva body, které splňují podmínky:

$$A_1[0; 4]$$

dosadíme do rovnice:

$$x - 3y + c = x - 3 \cdot 4 + c = 0 \Rightarrow c = 12$$

$$x - 3y + 12 = 0$$

$$A_2\left[0; -\frac{8}{3}\right]$$

dosadíme do rovnice:

$$x - 3y + c = x - 3 \cdot \left(-\frac{8}{3}\right) + c = 0 \Rightarrow c = -8$$

$$x - 3y - 8 = 0$$

Zadání splňují přímky $p_1: x - 3y + 12 = 0$ a $p_2: x - 3y - 8 = 0$.

Pedagogická poznámka: Velká část studentů potřebuje diskusi o roli bodu A v řešení příkladu. Jde o to, aby si uvědomili, že bod A je pouze pomocným cílem k nalezení

rovnici přímky a že si ho můžeme volit libovolně. Nic nám tedy nebrání si ho zvolit co nejjednodušeji.

Př. 2: Na přímce $x + 3y - 1 = 0$ najdi bod, který je od přímky $2x + y - 7 = 0$ vzdálen $2\sqrt{5}$.

Podobný příklad jako dva předchozí. Bod A je však konečným cílem.

Souřadnice bodu $A[a_x; a_y]$

Bod A je od přímky $2x + y - 7 = 0$ vzdálen $2\sqrt{5}$: $d = \frac{|ap_1 + bp_2 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|2 \cdot a_x + a_y - 7|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = 2\sqrt{5}$

\Rightarrow máme dvě neznáme, ale zatím pouze jednu rovnici \Rightarrow hledáme další informace v zadání.

Bod A leží na přímce $x + 3y - 1 = 0 \Rightarrow$ vyhovuje její rovnici $a_x + 3 \cdot a_y - 1 = 0$ - druhá rovnice.

$a_x + 3 \cdot a_y - 1 = 0 \Rightarrow a_x = 1 - 3a_y$ dosadíme do první rovnice:

$$\frac{|2 \cdot (1 - 3a_y) + a_y - 7|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \quad / \cdot \sqrt{5}$$

$$|2 - 6a_y + a_y - 7| = 10$$

$$|-5a_y - 5| = 10$$

$$|-5||a_y + 1| = 10$$

$$|a_y - (-1)| = 2 \Rightarrow \text{hledáme čísla vzdálená od } -1 \text{ o dva}$$

$$a_{y1} = 1 \Rightarrow a_x = 1 - 3a_y = 1 - 3 \cdot 1 = -2 \Rightarrow A_1[-2; 1]$$

$$a_{y2} = -3 \Rightarrow a_x = 1 - 3a_y = 1 - 3 \cdot (-3) = 10 \Rightarrow A_2[10; -3]$$

Př. 3: Jsou dány dvě rovnoběžné přímky $x - 2y + 6 = 0$ a $2x - 4y - 5 = 0$. Najdi přímku, která je s nimi rovnoběžná a má od obou stejnou vzdálenost.

Příklad je možné řešit dvěma způsoby: analyticky a napodobením konstrukce.

Analytické řešení:

Hledaná přímka je rovnoběžná s přímkou $2x - 4y - 5 = 0 \Rightarrow$ je popsána rovnicí

$2x - 4y + c = 0$. Koeficient c určíme pomocí libovolného bodu na této přímce. Zvolíme si

například bod s nulovou x -ovou souřadnicí: $2 \cdot 0 - 4y + c = 0 \Rightarrow y = \frac{c}{4}$.

Vzdálenost bodu $\left[0; \frac{c}{4}\right]$ je stejně vzdálen od přímek $x - 2y + 6 = 0$ a $2x - 4y - 5 = 0$.

$$\frac{\left|0 - 2 \cdot \frac{c}{4} + 6\right|}{\sqrt{1 + (-2)^2}} = \frac{\left|2 \cdot 0 - 4 \cdot \frac{c}{4} - 5\right|}{\sqrt{2 + (-4)^2}} \Rightarrow \frac{\left|-\frac{c}{2} + 6\right|}{\sqrt{5}} = \frac{|-c - 5|}{\sqrt{20}} \quad / \cdot 2\sqrt{5}$$

$$2 \left| -1 \left| \frac{c}{2} - 6 \right| \right| = |-1||c + 5|$$

$|c - 12| = |c + 5| \Rightarrow$ řešíme po intervalech:

- $c \in (-\infty; -5) \Rightarrow -c + 12 = -c - 5 \Rightarrow 17 = 0 \Rightarrow K = \emptyset$

- $c \in \langle -5; 12 \rangle \Rightarrow -c + 12 = c + 5 \Rightarrow 2c = \frac{7}{2} \Rightarrow c = \frac{7}{2}$
- $c \in \langle 12; \infty \rangle \Rightarrow c - 12 = c + 5 \Rightarrow -17 = 0 \Rightarrow K = \emptyset$

Hledanou přímkou je přímka $2x - 4y + \frac{7}{2} = 0$.

Konstrukční řešení:

rovnoběžku, která je osou pásu můžeme vést středem libovolné úsečky, která má krajní body na přímkách $x - 2y + 6 = 0$ a $2x - 4y - 5 = 0$.

- průsečík přímky $x - 2y + 6 = 0$ s osou y : $0 - 2y + 6 = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow$ bod $A[0; 3]$
- průsečík přímky $2x - 4y - 5 = 0$ s osou y : $2 \cdot 0 - 4y - 5 = 0 \Rightarrow y = -\frac{5}{4} \Rightarrow$ bod

$$B\left[0; -\frac{5}{4}\right]$$

$$3 + \left(-\frac{5}{4}\right) = \frac{12 - 5}{4} = \frac{7}{4} \Rightarrow \text{střed úsečky } AB: S_{AB}\left[0; \frac{7}{8}\right]$$


Rovnice rovnoběžky: $2x - 4y + c = 0$, dosadíme bod $S_{AB}\left[0; \frac{7}{8}\right]$: $2 \cdot 0 - 4 \cdot \frac{7}{8} + c = 0 \Rightarrow c = \frac{7}{2}$

Osou pásu je přímka $2x - 4y + \frac{7}{2} = 0$.

Pedagogická poznámka: Studenti mají tendenci udělat průměr z koeficientů c v obou rovnicích, což je možné pouze v případě, že jsou obě rovnice postavené na stejném normálovém vektoru.

Př. 4: Najdi všechny body roviny, které mají stejnou vzdálenost od přímek $p: x + 2y - 3 = 0$ a $q: 2x - y - 1 = 0$.

Z obrázku je zřejmé, že hledané body tvoří dvě přímky – osy obou úhlů, které přímky svírají.



. Zkusíme najít tyto přímky pomocí podmínky ze zadání.

Hledáme body $X[x; y]$.

Vzdálenost bodu $X[x; y]$ od přímky $p: x + 2y - 3 = 0$: $\frac{|x + 2y - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = 0$.

Vzdálenost bodu $X[x; y]$ od přímky $q: 2x - y - 1 = 0$: $\frac{|2x - y - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = 0$.

Obě vzdálenosti se rovnají: $\frac{|x + 2y - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x - y - 1|}{\sqrt{5}} \quad /: \sqrt{5}$

$|x + 2y - 3| = |2x - y - 1| \Rightarrow$ musíme odstranit absolutní hodnoty. Dvě možnosti:

- umocnění: $(x + 2y - 3)^2 = (2x - y - 1)^2$ - získáme strašné výrazy na obou stranách, ověřování si ušetříme, obě strany byly před umocněním kladné
- odstranění absolutní hodnoty: výhodnější nepřibudou nám druhé mocniny

Jak zjistíme, kdy odstranit absolutní hodnoty, výrazy uvnitř jsou složité. Jsou jen čtyři možnosti, které rovnou vyzkoušíme:

- oba výrazy záporné: $|x + 2y - 3| = |2x - y - 1| \Rightarrow -(x + 2y - 3) = -(2x - y - 1)$
 $-x - 2y + 3 = -2x + y + 1$
 $x - 3y + 2 = 0$
- oba výrazy kladné: $|x + 2y - 3| = |2x - y - 1| \Rightarrow x + 2y - 3 = 2x - y - 1$
 $x - 3y + 2 = 0$ - stejná přímka jako v předchozím případě
- levý výraz kladný, pravý záporný: $|x + 2y - 3| = |2x - y - 1| \Rightarrow$
 $x + 2y - 3 = -(2x - y - 1)$
 $x + 2y - 3 = -2x + y + 1$
 $3x + y - 4 = 0$
- levý výraz záporný, pravý kladný: $|x + 2y - 3| = |2x - y - 1| \Rightarrow$
 $-(x + 2y - 3) = 2x - y - 1$
 $-x - 2y + 3 = 2x - y - 1$
 $3x + y - 4 = 0$

Množinu všech bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost od přímek $p: x + 2y - 3 = 0$ a $q: 2x - y - 1 = 0$ tvoří dvojice přímek $x - 3y + 2 = 0$ a $3x + y - 4 = 0$.

Př. 5: Petáková:

strana 109/cvičení 65

strana 109/cvičení 66

strana 109/cvičení 68

strana 109/cvičení 74

Shrnutí: