

## 7.5.19 Hledání hyperbol

**Předpoklady:** 7516, 7517, 7518

**Pedagogická poznámka:** Některé příklady jsou zdlouhavější, pokud mám dostatek času probírám tuto a následující hodinu během tří vyučovacích hodin.

**Př. 1:** Napiš rovnici hyperboly, která má ohniska v bodech  $E[-5;3]$ ,  $F[7;3]$  a hlavní poloosu o délce 5.

Střed hyperboly je středem úsečky  $EF \Rightarrow S[1;3]$ .

Úsečka  $EF$  je rovnoběžná s osou  $x \Rightarrow$  hlavní poloosou je  $a = 5$ .

Excentricita je vzdálenost ohniska od středu  $e = |SE| = 6$ .

Určíme vedlejší poloosu:  $e^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b = \sqrt{e^2 - a^2} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$ .

Rovnice hyperboly: 
$$\frac{(x-1)^2}{25} - \frac{(y-3)^2}{11} = 1$$

**Př. 2:** Najdi rovnici rovnoosé hyperboly s ohnisky  $E[2;-3]$ ,  $F[2;1]$ .

Střed hyperboly je středem úsečky  $EF \Rightarrow S[2;-1]$ .

Úsečka  $EF$  je rovnoběžná s osou  $y \Rightarrow$  hlavní poloosou je  $b$ .

Excentricita je vzdálenost ohniska od středu  $e = |SE| = 2$ .

Hyperbola je rovnoosá  $\Rightarrow$  platí  $a = b$ .

Určíme poloosy:  $e^2 = a^2 + b^2$ , dosadíme  $a = b$ :  $e^2 = 2a^2 \Rightarrow a = \sqrt{\frac{e^2}{2}} = \sqrt{\frac{2^2}{2}} = \sqrt{2}$

Rovnice hyperboly: 
$$\frac{(y+1)^2}{2} - \frac{(x-2)^2}{2} = 1.$$

**Pedagogická poznámka:** Největším problémem je význam termínu rovnoosá hyperbola. Chci, aby jej studenti našli ve svých poznámkách.

**Př. 3:** Osy hyperboly jsou shodné s osami soustavy souřadnic, excentricita se rovná 5 a hyperbola prochází bodem  $M[3;-4]$ . Urči její rovnici.

Nevíme, která ze souřadných os je hlavní osou hledané hyperboly  $\Rightarrow$  dvě možnosti.

**Hlavní osou hyperboly je osa  $x$**   $\Rightarrow$  hyperbola má rovnici  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Dvě neznámé, máme jediný bod na dosazování  $\Rightarrow$  potřebujeme další rovnici, použijeme informaci o excentricitě:  $e = 5 \Rightarrow a^2 + b^2 = 25 \Rightarrow b^2 = 25 - a^2$ .

Dosadíme do rovnice: 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{25 - a^2} = 1.$$

Dosadíme bod  $M[3; -4]$ :  $\frac{3^2}{a^2} - \frac{(-4)^2}{25-a^2} = 1 \quad / \cdot a^2(25-a^2)$ .

$$9(25-a^2) - 16a^2 = a^2(25-a^2)$$

$$225 - 9a^2 - 16a^2 = 25a^2 - a^4$$

$$a^4 - 50a^2 + 225 = 0 \quad \text{provedeme substituci } a^2 = x.$$

$$x^2 - 50x + 225 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-50) \pm \sqrt{(-50)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 225}}{2 \cdot 1} = \frac{50 \pm 40}{2}$$

Dvě řešení:

- $x_1 = \frac{50+40}{2} = 45 \Rightarrow a_1^2 = 45 \Rightarrow b^2 = 25 - a^2 = 25 - 45 = -20$  nesmysl  $\Rightarrow a_1^2 = 45$  není řešení.
- $x_2 = \frac{50-40}{2} = 5 \Rightarrow a_2^2 = 5 \Rightarrow b^2 = 25 - a^2 = 25 - 5 = 20 \Rightarrow a^2 = 5$  je řešení.

Hledaná hyperbola má v případě, že její hlavní osa je totožná s osou  $x$  rovnici  $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$ .

Ted' druhá možnost: **Hlavní osou hyperboly je osa  $y$**   $\Rightarrow$  hyperbola má rovnici  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ .

Opět dosadíme za  $b$ :  $b^2 = 25 - a^2$  do rovnice:  $\frac{y^2}{25-a^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ .

Dosadíme bod  $M[3; -4]$ :  $\frac{(-4)^2}{25-a^2} - \frac{3^2}{a^2} = 1 \quad / \cdot a^2(25-a^2)$ .

$$16a^2 - 9(25-a^2) = a^2(25-a^2)$$

$$16a^2 - 225 + 9a^2 = 25a^2 - a^4$$

$$a^4 - 225 = 0 \quad \text{platí: } \sqrt{225} = 15$$

$$a^4 - 15^2 = 0$$

$$(a^2 - 15)(a^2 + 15) = 0$$

Dvě řešení:

- $a_1^2 = 15 \Rightarrow b^2 = 25 - a^2 = 25 - 15 = 10 \Rightarrow a^2 = 15$  je řešení.
- $a_2^2 = -15 \Rightarrow$  nesmysl, druhá mocnina nemůže být záporná.

Hledaná hyperbola má v případě, že její hlavní osa je totožná s osou  $y$  rovnici  $\frac{y^2}{10} - \frac{x^2}{15} = 1$ .

**Pedagogická poznámka:** Jen málokterý student přijde i po upozornění na to, že hledaná hyperbola může mít svislou hlavní osu a je tedy třeba dosazovat i do rovnice

$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ . Nemá cenu nechávat studenty na tomto místě příliš dlouho stát.

**Př. 4:** Napiš rovnici hyperboly, jejíž hlavní osa je shodná s osou  $x$  a vedlejší s osou  $y$  a která prochází body  $M[2; \sqrt{6}]$  a  $N[\sqrt{3}; 2]$ .

Hyperbola má rovnici:  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow$  máme dvě neznámé, ale můžeme dosazovat dva body  $\Rightarrow$  řešíme soustavu dvou rovnic.

$$\text{Dosadíme bod } M[2; \sqrt{6}]: \frac{2^2}{a^2} - \frac{(\sqrt{6})^2}{b^2} = 1 \quad / \cdot a^2 b^2.$$

$$\text{Dosadíme bod } N[\sqrt{3}; 2]: \frac{(\sqrt{3})^2}{a^2} - \frac{2^2}{b^2} = 1 \quad / \cdot a^2 b^2.$$

$$4b^2 - 6a^2 = a^2 b^2$$

$$3b^2 - 4a^2 = a^2 b^2 \quad \text{provedeme substituci: } a^2 = x, b^2 = y$$

$$4y - 6x = xy$$

$$3y - 4x = xy$$

Od první rovnice odečteme druhou:  $y - 2x = 0 \Rightarrow y = 2x$ .

Dosadíme do první rovnice:  $4 \cdot 2x - 6x = x \cdot 2x$ .

$$2x = 2x^2$$

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x-1) = 0$$

- $x_1 = a_1^2 = 0$  nesmysl, poloosa nemůže být nulová.
- $x_2 = 1 = a^2$  rozumný výsledek  $y = 2x = 2 \cdot 1 = 2 = b^2$ .

Hledaná hyperbola má rovnici  $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{2} = 1$ .

**Pedagogická poznámka:** Ještě výhodnější substitucí je  $\frac{1}{a^2} = x, \frac{1}{b^2} = y$ .

**Př. 5:** Napiš rovnici hyperboly, jestliže její asymptoty mají rovnice  $y = \pm 2x - 1$  a ohnisko je v bodě  $F[5; -1]$ .

Potřebujeme určit střed hyperboly. Střed hyperboly je průsečíkem asymptot  $\Rightarrow$  hledáme společný bod přímk  $y = 2x - 1$  a  $y = -2x - 1 \Rightarrow$  srovnávací metoda  $2x - 1 = -2x - 1$ .

$$4x = 0 \quad x = 0 \quad y = 2x - 1 = 2 \cdot 0 - 1 = -1$$

Asymptoty se protínají v bodě  $S[0; -1]$ , který je středem hyperboly.

Známe excentricitu:  $e = |SF| = 5$ .

Velikosti poloos udávají směrnice asymptot  $\Rightarrow \frac{b}{a} = k = 2 \Rightarrow b = 2a$ .

Dosadíme do vztahu mezi poloosami a excentricitou:

$$e^2 = 5^2 = a^2 + b^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$$

$$a^2 = 5 \Rightarrow a = \sqrt{5}$$

$$b = 2a = 2\sqrt{5}$$

Rovnice hledané hyperboly:  $\frac{x^2}{5} - \frac{(y+1)^2}{20} = 1$ .

**Př. 6:** Najdi rovnici hyperboly, která prochází bodem  $M [3; -1]$  a jejíž asymptoty mají rovnice:  $a_1 : 3x - y - 1 = 0$ ,  $a_2 : 3x + y - 5 = 0$ .

Podobný příklad jako předchozí. Střed hyperboly určíme jako průsečík asymptot:

- $a_1 : 3x - y - 1 = 0 \Rightarrow 3x = y + 1$
- $a_2 : 3x + y - 5 = 0 \Rightarrow 3x = 5 - y$

Srovnáme obě rovnice:  $y + 1 = 5 - y$ .

$$2y = 4$$

$$y = 2$$

Dopočítáme  $x$ :  $3x - y - 1 = 3x - 2 - 1 = 0$ .


$$x = 1$$

Hyperbola má střed v bodě  $S [1; 2]$ .

Ze směrníc asymptot určíme poměr poloos:  $k = 3 = \frac{b}{a} \Rightarrow b = 3a$ .

Zbývá určit, zda má hledaná hyperbola hlavní osu vodorovnou nebo svislou.

Nakreslíme si obrázek:



Z obrázku je vidět, že bod  $M$  leží napravo od asymptot  $\Rightarrow$  hledaná hyperbola má hlavní osu

vodorovnou  $\Rightarrow$  rovnice  $\frac{(x-1)^2}{a^2} - \frac{(y-2)^2}{(3a)^2} = 1$ .

Dosadíme bod  $M [3; -1]$  a dopočítáme hlavní poloosu:  $\frac{(3-1)^2}{a^2} - \frac{(-1-2)^2}{(3a)^2} = 1$ .

$$\frac{4}{a^2} - \frac{9}{9a^2} = 1 \quad / \cdot 9a^2$$

$$36 - 9 = 9a^2$$

$$a^2 = 3 \Rightarrow a = \sqrt{3}$$

$$b = 3a = 3\sqrt{3}$$

Hledaná hyperbola má rovnici  $\frac{(x-1)^2}{3} - \frac{(y-2)^2}{27} = 1$ .

**Př. 7:** Petáková:  
strana 126/cvičení 43  
strana 126/cvičení 48  
strana 126/cvičení 52  
strana 126/cvičení 53

**Shrnutí:**