

9.1.5 Permutace I

Předpoklady: 9101, 9102, 9103

Př. 1: Sportovního turnaje se účastní 5 družstev. Kolik existuje možných konečných pořadí?

Budeme postupně sestavovat pořadí:

- | | | |
|----------|-----|--|
| 1. místo | ... | 5 možností |
| 2. místo | ... | 4 možnosti (jeden tým už má určené pořadí) |
| 3. místo | ... | 3 možnosti (dva týmy už mají určené pořadí) |
| 4. místo | ... | 2 možnosti (tři týmy už mají určené pořadí) |
| 5. místo | ... | 1 možnost (čtyři týmy už mají určené pořadí) |

⇒ jakoukoliv možnost můžeme kombinovat s ostatními ⇒ násobíme mezi sebou ⇒ celkem existuje $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ možností, jak může vypadat konečné pořadí (vlastně jde o vytváření uspořádané pětice z pěti prvků).

Př. 2: Kolika způsoby se může seřadit při rozlosování do řady 10 dětí na letním táboře?

Dětem, které stavíme do řady, budeme postupně vybírat na místa v řadě:

- | | | |
|-----------|-----|--|
| 1. místo | ... | 10 možností |
| 2. místo | ... | 9 možnosti (jedno dítě už je vybráno) |
| 3. místo | ... | 8 možnosti (jedno dítě už je vybráno) |
| ... | | |
| 9. místo | ... | 2 možnosti (osm dětí je vybraných) |
| 10. místo | ... | 1 možnost (devět dětí už je vybraných) |

⇒ jakoukoliv možnost můžeme kombinovat s ostatními ⇒ násobíme mezi sebou ⇒ celkem existuje $10 \cdot 9 \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ možností, jak může vypadat konečné pořadí (vlastně jde o vytváření uspořádané desetice z deseti prvků).

Př. 3: Tři obětovaní studenti losují o pořadí, ve kterém se nechají „dobrovolně“ vyzkoušet. Kolika způsoby může losování skončit?

Stejně jako předchozí příklady, vybíráme postupně na pořadí:

- | | | |
|----------|-----|------------------------------------|
| 1. místo | ... | 3 možností |
| 2. místo | ... | 2 možnosti (jedno student vybrán) |
| 3. místo | ... | 1 možnosti (jedno student vybráni) |

⇒ jakoukoliv možnost můžeme kombinovat s ostatními ⇒ násobíme mezi sebou ⇒ celkem existuje $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ možností, jak může vypadat konečné pořadí (vlastně jde o vytváření uspořádané trojice ze tří prvků).

Všechny předchozí příklady jsou skoro stejné:

- mám n prvků
- z nich postupně vybírám n prvků
- z prvků sestavuji n -tici
- záleží na pořadí
- prvky se neopakují

⇒ n -tice, které jsme sestavovali se nazývají **permutace z n prvků**

Permutace z n prvků je uspořádaná n -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje právě jednou.

Př. 4: Jaký je vztah mezi permutacemi z n prvků a variacemi?

Permutace: z n prvků sestavuji upořádanou n -tice (používám všechny prvky právě jednou)
Variace: z n prvků sestavuji upořádanou k -tice (používám některé prvky maximálně jednou)
 \Rightarrow permutace je speciální případ variace (n členné variace z n prvků).

Permutace z n prvků je každá n -členná variace z těchto prvků.

Př. 5: Urči počet permutací z n prvků.

Vytváříme uspořádanou n -tici z n prvků:

1. člen: n možností
2. člen: $n-1$ možností
3. člen: $n-2$ možností

...

$(n-1)$ -ní člen: 2

n -tý člen: 1

Možnosti kombinujeme: $n \cdot (n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$

Mohli jsme také používat variační číslo: $V(n, n) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-n+1) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$

Počet permutací z n prvků značíme $P(n)$.

Součin $n \cdot (n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ patří v kombinatorice k nejběžnějším \Rightarrow zavádíme pro něj speciální symbol $n!$ (čteme n faktoriál).

Pro každé přirozené číslo n definujeme $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Počet $P(n)$ všech permutací z n prvků se rovná $P(n) = n!$.

Většina kalkulaček má speciální tlačítko pro faktoriál.

Př. 6: Rozepiš a vypočti:

a) $P(5)$

b) $P(1)$

c) $P(3)$

d) $P(50)$

a) $P(5) = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

b) $P(1) = 1$

c) $P(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

d) $P(50) = 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 =$

$= 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000$

Faktoriály jsou velmi brzo velmi velká čísla.

Př. 7: Vypiš všechny permutace ze tří prvků $\{a; b; c\}$.

Vypisujeme přehledně podle prvního prvku:

(a, b, c) , (a, c, b)

(b, a, c) , (b, c, a)

(c, a, b) , (c, b, a)

Počet permutací pomocí vzorce: $P(3) = 3! = 6 \Rightarrow$ odpovídá.

Př. 8: Televizního pořadu, ve kterém diváci kladou politikům nepříjemné otázky, se účastní i občané Nora, Oldřich, Pavlína, Radek, Stanislav, Tamara a Uršula. Urči počet všech možných pořadí, ve kterých:

- mohou položit své dotazy
- položí dotazy nejdříve ženy a pak muži
- položí svůj dotaz Pavlína a hned po ní Radek
- Nora položí svůj dotaz dřív než Tamara

a) mohou položit své dotazy

stejný příklad jako všechny na začátku: $P(7) = 7!$

b) položí dotazy nejdříve ženy a pak muži

otázky pokládají 4 ženy $\Rightarrow 4!$ možností, jak je seřadit

otázky pokládají 3 muži $\Rightarrow 3!$ možností, jak je seřadit

ke každému pořadí žen můžeme vystřídat všechna pořadí mužů a obráceně \Rightarrow počty možností mezi sebou násobíme $\Rightarrow 4! \cdot 3!$ možností

c) položí svůj dotaz Pavlína a hned po ní Radek

Pavlínu a Radka můžeme považovat za jediného účastníka diskuse \Rightarrow diskuse se účastní 6 tazatelů $\Rightarrow 6!$ možností

d) Nora položí svůj dotaz dřív než Tamara

Každému pořadí ve kterém položila Nora dotaz před Tamarou odpovídá jedno pořadí, ve kterém pouze prohodíme tyto dvě ženy a Tamara bude klást dotaz před Norou \Rightarrow hledaná

pořadí tvoří přesně polovinu všech \Rightarrow je jich $\frac{7!}{2}$

Př. 9: Petáková:

strana 146/cvičení 47

strana 146/cvičení 48

Shrnutí: Pokud tvoříme z n prvků uspořádané n -tice máme $n! = n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$ možností.