

10.2.4 Derivace elementárních funkcí II

Předpoklady: 10203

Př. 1: Urči derivaci funkce $y = x^n; n \in \mathbb{N}$.

Budeme postupovat stejně jako předtím dosazením do vzorce:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f(x_0) = x_0^n$$

$$f(x_0 + \Delta x) = x_0^n + \binom{n}{1} x_0^{n-1} \Delta x + \binom{n}{2} x_0^{n-2} \Delta x^2 + \binom{n}{3} x_0^{n-3} \Delta x^3 + \dots + \binom{n}{n} \Delta x^n \text{ (binomická věta)}$$

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0^n + \binom{n}{1} x_0^{n-1} \Delta x + \binom{n}{2} x_0^{n-2} \Delta x^2 + \dots + \binom{n}{n} \Delta x^n - x_0^n}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\binom{n}{1} x_0^{n-1} \Delta x + \binom{n}{2} x_0^{n-2} \Delta x^2 + \dots + \binom{n}{n} \Delta x^n}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\binom{n}{1} x_0^{n-1} + \binom{n}{2} x_0^{n-2} \Delta x + \dots + \binom{n}{n} \Delta x^{n-1} \right) = \\ &= n x_0^{n-1} \end{aligned}$$

\Rightarrow umíme derivovat všechny mocninné funkce s přirozeným mocnitelem

$$(x^3)' = 3 \cdot x^{3-1} = 3x^2$$

Př. 2: Vypočti derivace funkcí:

a) $y = x^2$

b) $y = x^4$

c) $y = x$

a) $y = x^2$ $(x^2)' = 2 \cdot x^{2-1} = 2x$

b) $y = x^4$ $(x^4)' = 4 \cdot x^{4-1} = 4x^3$

c) $y = x$ $(x)' = 1 \cdot x^{1-1} = x^0 = 1$

Př. 3: (BONUS) Urči derivaci funkce $y = \sin x$. Při odvození využít vztahy:

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \text{ a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$


$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f(x_0) = \sin x_0$$

$$f(x_0 + \Delta x) = \sin(x_0 + \Delta x)$$

$$\begin{aligned}
f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0}{\Delta x} = \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{x_0 + \Delta x + x_0}{2} \cdot \sin \frac{x_0 + \Delta x - x_0}{2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} = \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) \frac{2 \cdot \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{2\Delta x}{2}} = \\
&= \cos x_0 \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x_0 \cdot 1 = \cos x_0
\end{aligned}$$

Př. 4: Nakresli do jednoho obrázku grafy funkcí $y = \sin x$ a $y = \cos x$. Na obrázku ukaž, jak hodnoty funkce $y = \cos x$ popisují změny hodnot funkce $y = \sin x$.




Na obrázku jsou funkce $y = \sin x$, $y = \cos x$

Sledujeme grafy po intervalech:

- $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$: funkce $y = \sin x$ roste čím dál pomaleji (strmost křivky se zmenšuje) \Rightarrow derivace musí být kladná, a její hodnoty klesají k nule
- $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$: funkce $y = \sin x$ klesá čím dál rychleji (strmost křivky se zvětšuje) \Rightarrow derivace musí být záporná, a její velikost postupně roste
- $x \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$: funkce $y = \sin x$ klesá čím dál pomaleji (strmost křivky se zmenšuje) \Rightarrow derivace musí být záporná, a její velikost postupně klesá a hodnoty se blíží k nule
- $x \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$: funkce $y = \sin x$ roste čím dál rychleji (strmost křivky se zvětšuje) \Rightarrow derivace musí být kladná, a její velikost postupně roste

Př. 5: Nakresli do obrázku graf funkce $y = \cos x$. Do obrázku načrtni graf funkce $(\cos x)'$. Odhadni její předpis.



Sledujeme graf funkce $y = \cos x$ po intervalech:

- $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$: funkce $y = \cos x$ klesá čím dál rychleji (strmost křivky se zvětšuje) \Rightarrow derivace musí být záporná, a její velikost postupně roste
- $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$: funkce $y = \cos x$ klesá čím dál pomaleji (strmost křivky se zmenšuje) \Rightarrow derivace musí být záporná, a její velikost postupně klesá a hodnoty se blíží k nule
- $x \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$: funkce $y = \cos x$ roste čím dál rychleji (strmost křivky se zvětšuje) \Rightarrow derivace musí být kladná, a její velikost postupně roste
- $x \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$: funkce $y = \cos x$ roste čím dál pomaleji (strmost křivky se zmenšuje) \Rightarrow derivace musí být kladná, ale její hodnoty klesají k nule

graf derivace je nakreslen modrou barvou, jedná se zřejmě o funkci $y = -\sin x$

Shrňme si všechny zatím získané vzorce:

- Pro funkci $y = x^n$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, platí $y' = nx^{n-1}$.
- Pro funkci $y = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$, platí $y' = \cos x$.
- Pro funkci $y = \cos x$, $x \in \mathbb{R}$, platí $y' = -\sin x$.

Stejně jako u limit i u derivací platí vzorce pro sčítání, odčítání, násobení a dělení:

Věta o derivaci součtu, rozdílu a součinu s konstantou:

Nechť jsou dány funkce u , v a konstanta $c \in \mathbb{R}$. Jestliže funkce u , v mají v bodě x_0 derivaci, mají v bodě x_0 derivaci i funkce $u + v$, $u - v$ a cu a platí:

- $(u + v)'(x_0) = u'(x_0) + v'(x_0)$
- $(u - v)'(x_0) = u'(x_0) - v'(x_0)$
- $(cu)'(x_0) = c \cdot u'(x_0)$

Zkrácený zápis:

- $(u + v)' = u' + v'$
- $(u - v)' = u' - v'$

- $(cu)' = c \cdot u'$

Př. 6: Vypočti derivace:

a) $(x + \sin x)'$ b) $(2 - \cos x)'$ c) $(3x^3)'$

a) $(x + \sin x)' = x' + (\sin x)' = 1 + \cos x$

b) $(2 - \cos x)' = 2' - (\cos x)' = 0 - (-\sin x) = \sin x$

c) $(3x^3)' = 3 \cdot (x^3)' = 3 \cdot 3x^2 = 9x^2$

Př. 7: Vypočti derivace:

a) $(x^3 - 2x^2 + 3x - 2)'$ b) $(2 \sin x - 3 \cos x)'$ c) $(3x^3 - 2 \sin x + 1)'$

a) $(x^3 - 2x^2 + 3x - 2)' = 3x^2 - 2 \cdot 2x + 3 \cdot 1 = 3x^2 - 4x + 3$

b) $(2 \sin x - 3 \cos x)' = 2 \cos x - 3(-\sin x) = 2 \cos x + 3 \sin x$

c) $(3x^3 - 2 \sin x + 1)' = 3 \cdot 3x^2 - 2 \cos x + 0 = 9x^2 - 2 \cos x$

Př. 8: Vypočti derivace:

a) $[(x^2 - 1)^2]'$ b) $\left(\frac{x^3 + 2x^2 + x}{x}\right)'$ c) $\left(\frac{x^2 - 1}{x + 1}\right)'$

a) $[(x^2 - 1)^2]' = (x^4 - 2x^2 + 1)' = 4x^3 - 2 \cdot 2x^1 + 0 = 4x^3 - 4x$

b) $\left(\frac{x^3 + 2x^2 + x}{x}\right)' = (x^2 + 2x + 1)' = 2x + 2 \cdot 1 + 0 = 2x + 2$

c) $\left(\frac{x^2 - 1}{x + 1}\right)' = \left(\frac{(x-1)(x+1)}{x+1}\right)' = (x-1)' = 1$

Pedagogická poznámka: Někteří studenti samozřejmě začnou derivovat složenou funkci nebo podíly špatně. Je nutné je zastavit a upozornit, aby používali pouze taková pravidla, která znají a dělení obešli.

Př. 9: Zkus ověřit zda pro derivaci součinu funkcí může platit vzorec $(uv)' = u' \cdot v'$.

Víme, že platí: $(x^5)' = 5x^4$

Napišeme si x^5 jako součin a zderivujeme ho podle předpokládaného vzorce:

$(x^5)' = (x^3 \cdot x^2)' = (x^3)'(x^2)' = 3x^2 \cdot 2x = 6x^3$ - špatný výsledek

⇒ vzorec $(uv)' = u' \cdot v'$ neplatí

Př. 10: Petáková:

strana 155/cvičení 19 f_8, f_{11}

strana 155/cvičení 20 g_1, g_4

Shrnutí: „Přirozeným“ způsobem můžeme derivovat pouze součet a rozdíl funkcí.